













1








Pull-apart basins






“Nosotros estamos quemando el matorral de tojo para repoblar y estos paisanos están comprando sus semillas para sembrarlo”. 1963

E. Rivas di, en "Serra de San Mamede, que "Ferro Couselo...chega a afirmar que a Serra de Sanamede foi algo así como unha mesta maior no centro da provincia (de Ourense)".

5



CUADRO N.º 4


EXPORTACIONES DE GANADO VACUNO A INGLATERRA
(totales por decenios)

	n.º de cabezas
1842-1850	8.013
1851-1860	22.876
1861-1870	126.515
1871-1880	212.799
1881-1890	174.095
1891-1900	18.523
Total	558.821

CUADRO N.º 5

VOLUMEN DE VACUNO EXTRAIDO, 1842-1931
(exportado y transportado por FFCC.)
(promedios anuales por decenios) (18)

	n.º de reses
1842-1851	880,2
1852-1861	3.004,7
1862-1871	20.009,5
1872-1881	34.935,0
1882-1891	39.294,0
1892-1901	46.751,4
1902-1911	97.951,8
1912-1921	196.857,5
1922-1931	228.238,3






Usos do lume:

- Creación e rexuvenecemento de pastos.
- Queima de mato e broza para fertilizar.
- Limpeza do monte abastado (dificulta a mobilidade, acubilla feras).
- Xestión da caza (creación de zonas abertas, apertura de corredores).
- Searas.
- Carboneo (torgos, troncos)
- Habilitación para angueiras específicas (p. ex preparación para campo de neve).





Tabla 2: Tipos funcionales presentes en Galicia (Reyes y Casal, 2008), ampliado por ROCES (2009).

TIPOS FUNCIONALES	ESPECIES
Dependientes del Fuego Germminación ↑ Rebrote ↑	<i>Ulex europaeus</i> L., <i>Ulex gallii</i> Planchon, <i>Ulex minor</i> Roth., <i>Ulex micranthus</i> (Lange) Nyman, <i>Cytisus multiflorus</i> (L'Her) Sweet, <i>Cytisus scoparius</i> L., <i>Pterispartum tridentatum</i> (L.) Willk., <i>Genista berberidea</i> Lange, <i>Genista triacanthos</i> Brot., <i>Halimium lasianthum</i> (Lam.) Spach, <i>Erica vagans</i> L., <i>E. ciliaris</i> Loeff. Ex L.
Dependientes de Rebrote Rebrote ↑	<i>Agrostis curtisii</i> Kerguelen, <i>Avenula marginata</i> (Lowe) J. Holub, <i>Pseudarrhenatherum longifolium</i> (Thore) Rouy, <i>Erica erigena</i> R. Ross, <i>Erica scoparia</i> L., <i>Erica tetralix</i> L., <i>Daboecia cantabrica</i> (Huds) K. Koch., <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull <i>Erica australis</i> L.
Dependientes de Germminación Germminación ↑	<i>Cytisus striatus</i> (Hill) Rothm., <i>Erica umbellata</i> L.
Sensibles al Fuego	



Distribución de las Morenas Galegas.

En 1778 Raimundo Ibanez, creador de la fundición de Sargadelos, refiriéndose a los montes de Galicia y Asturias se pregunta: «¿A que parte arrojamós la vista en que el fuego repetido de 6 en 6 años par una reprehensible e inveterada costumbre no haya llevado a un punto final de desolacion?»




corte transversal da raíz de *Calluna*
coas células albergando hifas



FIG. 3. Individual epidermal cell of *Calluna* released from the root axis by maceration after rinsing in distilled water, showing emergence of mycorrhizal fungus from hyphal complex occupying the cell. Such direct observation of fungal growth from the cell is desirable if prerequisite for any claims of mycorrhizal status.

Célula da raíz de *Calluna* separada,
da que saen as hifas que prospectan o solo



Apotecios *Hymenoscyphus peruni* (non *ericae*)